

Dobrý den,

zasílám Vám připomínky k záměru VTE Norberčany.
Žádám o Vaše vyjádření a případné nové přezkoumání.

Nedostatky:

Vyhodnocení vlivu na zvláště chráněné druhy ptáků:

1) Rešerše dat z Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP)- provedeno se zaměřením na vlastní plochu záměru + v širším území na ploše 100 km² (omezení velikosti plochy při filtraci dat)

Vlivy záměru na konkrétní druhy jsou následně v kapitole 5. Vlivy záměru u ptáků identifikovány pouze:

S použitím podkladu České společnosti ornitologické – mapa citlivosti ptáků vůči výstavbě větrných elektráren v Česku.

2) S použitím tabulky Braniborského státního úřadu pro životní prostředí – Vliv větrných turbín na ptáky a netopýry, která obsahuje souhrnná data o počtu jedinců některých druhů ptáků usmrčených po střetu s větrnými elektrárnami.

Zde autor hodnocení předkládá výběr těchto údajů pro druhy, které z území záměru byly zjištěny (včetně druhů zjištěných z Nálezové databáze v kruhové ploše 100 km²). Ale chybí zde jakákoliv aplikace těchto poznatků pro zhodnocení rizik záměru pro zjištěné druhy.

Následně v kapitole 5.6 Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v prostoru záměru jsou hodnoceny už pouze jen ty druhy, které byly zjištěny přímo v plochách záměru.

Z ptáků je tak následně bodově hodnocen vliv pouze na soubor několika druhů:

Bramborníček hnědý, holub doupňák, chřástal polní, krkavec velký, moták lužní, strnad luční, ůhýk obecný (přestože v materiálu je uvedeno zjištění také ůhýka šedého).

Výběr záznamů v kruhové oblasti o poloměru cca 11,2 km (100 km²) není přitom přehnaně rozsáhlý v poměru k dimenzím záměru. Měl by být hodnocen i vliv na tyto ptáky. Z hlediska potravních areálů větších druhů jde o zcela relevantní plochu. V ní může existence souboru větrných elektráren představovat jednak změnu podmínek v území (zásah do biotopu, rušení) a také riziko střetu pro řadu z nich. Zejména těch, které se zde častěji resp. dlouhodobě vyskytují (zejména pokud je území součástí jejich potravního areálu v hnízdním období). A současně více u těch, které létají běžně i ve větších výškách a riziko jejich střetu s rotory je tedy pravděpodobnější.

Z druhů, jejichž výskyt zde byl zjištěn a jsou uvedeny i v přehledu druhů zjištěných z NDOP v tabulce č. 8 i v tabulce č. 9 Hodnocení jsou to např.:

krahujec obecný, linduška luční, orel skalní, výr velký, čáp bílý, čáp černý, moták pochop, moták pilich, ostříž lesní, jeřáb popelavý, orel mořský, luňák červený.

Tzn. jde o ptáky, kteří se tu vyskytují a zároveň u nich (podle čísel v tab. 9) ke střetům dochází, a to v poměrně vysokých počtech, přestože řada z nich jsou druhy s malou nebo relativně menší populační hustotou (dravci, velké druhy, ...).

Poznámka k jeřábu popelavému: Některé z nálezových dat v NDOP jsou už za hranicí kruhové oblasti, kterou použili autoři hodnocení (omezení filtrace dat na oblast o výměře 100 km²) a současně jsou některé údaje až z letošního roku. Vesměs jde o záznamy lokalizované do prostoru od hranice k.ú.

Moravského Berouna/k.ú. Stará Libavá severně směrem ke Slunečné.

S pozdravem

